



Az MME „A madárbarát Magyarországért!”

Veszélyeztető tényezők


Szikes tavakat kedvelő életmódja miatt kedvezőtlenül hatott a fajra ezen élőhelytípusnak az 1980-as évek végétől kezdődő, jelentős felszámolódása. A klímaváltozás, a szárazodó tavaszok jelentősen befolyásolják az adott évi költő párok számát. Míg csapadékosabb években akár 1000 pár is fészkelhet az országban, száraz teleket követően ezek száma akár 200 pár alatt is maradhat.



Védelem

Védelmének alapját a még meglévő, természetes szikes tavak megőrzése és az egykori fészkelőhelyek rehabilitációja jelenti.

Magyarországon **fokozottan védett**, természetvédelmi értéke 250 000 Ft.



Csatlakozzon hozzánk!

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

1121 Budapest, Költő u. 21. • +361 275 6247 • mme@mme.hu
www.mme.hu • www.csipogo.hu



Hazánk madárvédelmét támogathatja adományával és adójának 1%-ával!
Bankszámlaszámunk: 11712004-20011215
Adószámunk: 19001243-2-43



Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület

www.mme.hu





Megjelenés

A gólyatöcs egyik szép régi nevét – széki gólya – nem véletlenül kapta. A feltűnően hosszú lábú, hegyes csőrű parti madár, fekete-fehér színével valóban egy miniatűr fehér gólyához hasonlít.

Élőhely

Legfontosabb hazai élőhelyei a Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon találhatók. A faj itt találja meg azokat a sekély, szikes tavakat és öntésterületeket, ahol hosszú lábaival a vízben gázolva táplálkozik, a kiemelkedő szárazulatokon pedig költeni tud. Vonulási időszakban bármely sekély vizű élőhelyen, belvizes szántókon és gyepeken is találkozhatunk vele.

Elterjedés

Ez a madár igazi világpolgár. Öt alfaja az Antarktisz kivételével az összes kontinensen előfordul, mintegy 302 millió km²-en.

Költés

Kopár, sekély vízborítású helyeken laza telepeket alkotva és egyesével is költ, hazánkban sokszor a gulipán társaságában. Fészke kis talajmélyedés, amibe növényi törmelékeket hord, és úgy alakítja ki, hogy lehetőség szerint víz vegye körül. Fészekalja 3-5 tojásból áll, a kotlási idő 25-26 nap. A fiókák fészekhagyók, egy hónapos korukban már képesek repülni, de szüleikkel még ezután is összetartanak.

Vonulás

Elterjedési területének déli részén állandó, az Eurázsiaián és Észak-Amerikában fészkelők viszont vonulók.

A hazai állomány hosszú távú vonuló. Tavasszal, március-áprilisban érkeznek meg Afrika trópusi részeiből. A költési időszak végén korán útra kelnek, többségük augusztusban el is hagyja hazánkat.

Táplálkozás

Főleg vízi rovarokat és más gerinctelenekeket, elsősorban alacsonyabb rendű rákokat szedeget össze a víz színétől és a parti iszapfelületről.



Állomány nagyság

Óriási elterjedési területének köszönhetően világállománya is nagy, 450-780 ezer egyedre becsülhető, ebből az európai állomány mintegy 108-151 ezer egyed. Magyarországon rendszeres fészkelő, a költő párok száma ingadozó, az adott év csapadék-mennyiségétől függően 200-1000 pár között alakul.

